

Images in medicine

Plaies abdominales par arme à feu: expériences des urgences CHU

Hassan II, Fès, Maroc



Abdominal gunshot wounds: experiences in the Emergency

Department at the Hassan II University Hospital in Fes, Morocco

Ahmed Zerhouni^{1,&}, Imane Toughrai²

¹Service de CHB, CHU Hassan II, Fès, Maroc, ²Service de Chirurgie Digestive et Endocrinienne, CHU Hassan II, Fès, Maroc

[&]Corresponding author: Ahmed Zerhouni, Service de CHB, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Mots clés: Arme à feu, projectiles, plaies de l'abdomen

Received: 16/02/2016 - Accepted: 09/09/2016 - Published: 08/08/2018

Pan African Medical Journal. 2018; 30:265 doi:10.11604/pamj.2018.30.265.9133

This article is available online at: <http://www.panafrican-med-journal.com/content/article/30/265/full/>

© Ahmed Zerhouni et al. The Pan African Medical Journal - ISSN 1937-8688. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<http://creativecommons.org/licenses/by/2.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Image en médecine

We report the case of a young couple, a 30-year old man and his 21-year old wife victim, after a family conflict, of shotgun shooting. Shotgun is allowed in Morocco during the game hunting season. Surgical exploration of both patients showed multiple lesions of the digestive tract as well vascular wound on the man's femoral artery causing hemorrhagic shock. The study of gunshot wounds is based on resulting tissues lesions which vary as a function of the different shooting parameters. The impact, the path and the found projectile allow detect the type of weapons and the shooting conditions. Gunshot injuries may be very different. They depend on: the weapon in question, the trajectory of the projectile in relation to the hit body, the shooting distance and, especially, the characteristics of the projectile. Contused wounds are most common, with very specific features. They are caused by a criminal act, a suicidal act or an accidental act.

Key words: Firearm, shots, abdominal wounds

Jeune couple, un homme de 30 ans et sa femme de 21 ans victimes d'une fusillade suite à un conflit familial, par un fusil de chasse

autorisé au Maroc lors de la saison de chasse aux gibiers. A leur arrivée au centre hospitalier, l'homme est inconscient, tachycarde à 120 b/min avec une tension artérielle à 70/30 mmHg. A l'inspection de son abdomen on a observé la présence de plusieurs plaies pénétrantes au niveau du pubis du Scarpa et la face antérieure de la cuisse droite, un hématome en regard et abolition du pouls fémoral homolatérale, après la mise en condition, l'exploration chirurgicale a montré une plaie de l'artère fémorale droite. L'hémostase est obtenue après la résection de la partie lésée. Une exploration de la cavité abdominale a révélé la présence de plusieurs plaies grêliques. Le geste a consisté à une résection de la partie perforée avec confection d'une anastomose iléo-iléale. Pour la jeune dame, à son admission elle était stable sur le plan hémodynamique, la présence de plusieurs plaies au niveau de l'abdomen. Vu l'état stable de la patiente on a complété par une tomodensitométrie qui a objectivé la présence de plusieurs projectiles pénétrant le tube digestif avec présence d'un pneumopéritoïne. L'exploration chirurgicale a objectivé la présence d'une partie jéjunale cible de projectile ainsi le colon transverse le geste a consisté à une résection du grêle perforé ainsi la résection du colon transverse avec confection d'une anastomose grelo-grelique et une autre anastomose colo-colique.



Figure 1: (A,B) images montrant les plaies pariétale par l'arme a feu; (C,D) 2 images scannographiques montrant les projectiles en intra-péritonéale; (E,F) pièce opératoire de résection grélique et colique